

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET FLU FORTE šumeće tablete

paracetamol, askorbatna kiselina, klorfenamin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je LUPOCET FLU FORTE i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FLU FORTE
3. Kako uzimati LUPOCET FLU FORTE
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LUPOCET FLU FORTE
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je LUPOCET FLU FORTE i za što se koristi

LUPOCET FLU FORTE primjenjuje se u odraslih i djece starije od 12 godina za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripe djelovanjem triju djelatnih tvari: paracetamola, klorfenamina i askorbatne kiseline.

Simptomi gripe uključuju curenje i svrbež nosa, suzne oči, promuklost, kašalj, glavobolju, vrućicu i iscrpljenost.

LUPOCET FLU FORTE sadrži tri djelatne tvari koje imaju različito djelovanje:

- **paracetamol** ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu
- **klorfenamin** smanjuje začepljenost nosa, ublažava simptome curenja iz nosa i suznih očiju
- **askorbatna kiselina** (vitamin C) nadoknađuje povećane potrebe za ovim vitaminom kod akutnih virusnih infekcija.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FLU FORTE

Nemojte uzimati LUPOCET FLU FORTE:

- ako ste alergični na djelatne tvari (paracetamol, klorfenamin ili askorbatnu kiselinu) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na neki drugi sličan lijek (npr. antihistaminike – lijekove koji se koriste u liječenju različitih alergija)
- ako ste trudnica ili dojilja (vidjeti dio **Trudnoća, dojenje i plodnost**)
- ako bolujete od nedostatka enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze ili teške hemolitičke anemije
- ako imate teški poremećaj rada jetre
- ako bolujete od glaukoma (povišenog očnog tlaka)

- ako imate hipertrofiju (povećanje) prostate, opstrukciju (suženje) vrata mokraćnog mjehura, stenozu pilorusa ili dvanaesnika (suženja dijela želuca ili dvanaesnika), ili neko drugo suženje probavnog ili mokraćno-spolnog sustava.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET FLU FORTE:

- ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom
- ako ste osoba starije životne dobi (65 godina i više) s poremećajem rada bubrega i/ili jetre
- ako ste imali ili imate bubrežne kamence
- ako imate hemokromatozu (pretjerano taloženje željeza u jetri i drugim organima)
- ako imate poremećaj u stvaranju krvnih stanica (*thalassaemia major*, sideroblastična anemija).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Djeca i adolescenti

LUPOCET FLU FORTE se **ne smije** primjenjivati u djece mlađe od 12 godina zbog visoke pojedinačne i dnevne doze paracetamola. Za djecu u dobi 6 do 12 godina namijenjene su LUPOCET FLU šumeće tablete.

Drugi lijekovi i LUPOCET FLU FORTE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Tijekom primjene LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta **nemojte** primjenjivati neki drugi lijek protiv gripe i prehlade ili neki drugi lijek koji sadrži paracetamol jer se na taj način povećava opasnost od prekoračenja preporučene dnevne doze paracetamola.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom prije primjene LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta:

- *rifampicin* (lijek za liječenje tuberkuloze)
- *cimetidin* (lijek za liječenje žgaravice i drugih poremećaja probavnog sustava koji nastaju zbog prekomjernog lučenja želučane kiseline)
- *glutetimid*, *fenobarbiton*, *karbamazepin* (lijekove za liječenje epilepsije)
- *amikacin*, *gentamicin* i *netilmicin* (lijekove za liječenje bakterijskih infekcija)
- *tricikličke antidepressive* (lijekove za liječenje depresije)
- *neuroleptike*, *sedative*, *trankvilizatore* (lijekove za smirenje)
- *barbiturate*, *hipnotike* (lijekove za spavanje)
- *antikoagulanse* (lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi)
- *metoklopramid* (lijek protiv mučnine i povraćanja)
- *oralne kontraceptive* (lijekove za sprječavanje začeća)
- *inhibitore monoaminoooksidaze - MAO-inhibitore* (lijekove za liječenje nekih vrsta depresije) u posljednja 2 tjedna.

LUPOCET FLU FORTE s hranom, pićem i alkoholom

LUPOCET FLU FORTE uzimajte nakon obroka.

Tijekom uzimanja LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta **nemojte** konzumirati alkoholna pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudnica ili dojilja, odnosno ako sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, **ne smijete** uzimati LUPOCET FLU FORTE.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET FLU FORTE može uzrokovati umor, pospanost i vrtoglavicu. Ako imate ovakve simptome, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

LUPOCET FLU FORTE sadrži aspartam.

Ovaj lijek sadrži 40 mg aspartama u jednoj šumećoj tableti.

Aspartam je izvor fenilalanina. Može Vam naškoditi ako bolujete od fenilketonurije, rijetkog genetskog poremećaja kod kojeg dolazi do nakupljanja fenilalanina jer ga tijelo ne može ukloniti na odgovarajući način.

LUPOCET FLU FORTE sadrži sorbitol.

Ovaj lijek sadrži 212 mg sorbitola u jednoj šumećoj tableti.

Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek.

LUPOCET FLU FORTE sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 313.644 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) po tableti. To odgovara 15,68% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

3. Kako uzimati LUPOCET FLU FORTE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Ne uzimajte veću dozu od preporučene bez savjetovanja s liječnikom.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzimajte 1 šumeću tabletu svakih 4-6 sati. Prema potrebi možete uzeti 2 šumeće tablete odjednom svakih 6-8 sati. Unutar 24 sata nemojte uzeti više od 8 šumećih tableta.

Stariji

Osobe starije životne dobi osobito se moraju pridržavati preporučenog doziranja, zbog povećane osjetljivosti na lijekove ovakve vrste.

Primjena u djece (mlađe od 12 godina)

LUPOCET FLU FORTE se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Način primjene

Lijek se uzima kroz usta.

LUPOCET FLU FORTE uzimajte nakon jela kako biste smanjili mogućnost nastanka probavnih smetnji.

LUPOCET FLU FORTE ima oblik šumeće tablete.

Jednu šumeću tabletu otopite u pola čaše vode.

Trajanje primjene

Ovaj lijek se primjenjuje kratkotrajno. Ne smijete uzimati ovaj lijek bez savjetovanja s liječnikom dulje od 3 dana (u slučaju vrućice) odnosno 5 dana (u slučaju boli).

Ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 3 dana liječenja, potražite savjet liječnika o nastavku liječenja.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET FLU FORTE

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4-6 sati. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako uzmete više LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta, odmah se javite najbližoj medicinskoj ustanovi ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika jer postoji opasnost od odgođenog, ozbiljnog oštećenja jetre. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Predoziranje se najčešće može očitovati simptomima kao što su mučnina, povraćanje, znojenje, pospanost, tromost i usporeno disanje.

U slučaju primjene izrazito visokih doza može doći do teškog oštećenja jetre.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Pri pravilnoj primjeni LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nuspojave su rijetke.

Prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na pojavu alergijske reakcije u obliku kožnog osipa i svrbeža, otekline usnica i lica ili kratkog daha.

Ostale zabilježene nuspojave su sljedeće:

- suha usta, probavne smetnje
- slabost
- pospanost, omaglica
- povećana gustoća sekreta iz dišnih putova
- otežano mokrenje, poremećaj rada bubrega
- osjetljivost na sunčevu svjetlost
- poremećaji krvne slike
- poremećaj rada jetre.

Vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Prijavljivanje nuspojave

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojave:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljuvanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET FLU FORTE

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nakon otvaranja LUPOCET FLU FORTE treba čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUPOCET FLU FORTE sadrži

- Djelatne tvari su paracetamol, askorbatna kiselina (vitamin C) i klorfenamin.
Jedna šumeća tableta sadrži 500 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline (vitamina C) u obliku natrijevog askorbata te 1,41 mg klorfenamina u obliku klorfenaminmaleata.
- Pomoćne tvari su: citratna kiselina, bezvodna; natrijev hidrogenkarbonat; sorbitol (E420); natrijev karbonat, bezvodni; aspartam (E951); aroma naranče; aroma limuna; povidon K30; simetikon emulzija (30 postotna).

Kako LUPOCET FLU FORTE izgleda i sadržaj pakiranja

LUPOCET FLU FORTE je bijela ili gotovo bijela, okrugla, ravna tableta promjera oko 25 mm.

10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem.

20 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 05. ožujka 2021.