

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

RAMZID 2,5 mg / 12,5 mg tablete RAMZID 5 mg / 25 mg tablete

ramipril/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je RAMZID i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati RAMZID
3. Kako uzimati RAMZID
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati RAMZID
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je RAMZID i za što se koristi

RAMZID je kombinacija dvaju lijekova koji se zovu ramipril i hidroklorotiazid.

Ramipril pripada skupini lijekova zvanih ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima). Djeluje tako da:

- smanjuje stvaranje tvari koje povisuju krvni tlak u Vašem tijelu,
- čini Vaše krvne žile opuštenijima i širimima,
- olakšava Vašem srcu pumpati krv po tijelu.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova zvanih "tiazidski diuretici" ili "tablete za vodu". Djeluje tako da povećava količinu vode (urina) koju izlučujete. To pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

RAMZID se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka. Dvije djelatne tvari zajedno snižavaju krvni tlak. Koristite se zajedno kad liječenje samo jednom od tih tvari nije bilo uspješno.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati RAMZID

Nemojte uzimati RAMZID:

- ako ste alergični na ramipril, hidroklorotiazid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na lijekove slične ovom lijeku (drugi ACE inhibitori ili lijekovi derivati sulfonamida)
Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oteklinu usana, lica, grla ili jezika.
- ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju zvanu angioedem. Znakovi te reakcije uključuju svrbež, osip (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oteklinu grla i jezika, otok oko očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.

- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat)
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 - racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva
 - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 - vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti.
- ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se pri tom koristi, ovaj lijek možda nije pogodan za Vas.
- ako imate teških problema s jetrom
- ako imate abnormalne količine soli u krvi (kalcij, kalij, natrij)
- ako imate problema s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenozna bubrežna arterija)
- tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio '**Trudnoća i dojenje**')
- ako dojite (vidjeti dio '**Trudnoća i dojenje**')
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati RAMZID ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte s liječnikom prije uzimanja RAMZIDA.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete RAMZID:

- ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima
- ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog bolesti – povraćanje, proljeva, neuobičajeno pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika ili zbog dijalize)
- ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija)
- ako trebate primiti anestetik; to se odnosi na operaciju ili zahvat na zubima, pri čemu ćete možda trebati prekinuti liječenje ovim lijekom jedan dan prije; upitajte liječnika za savjet
- ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (što se vidi na krvnoj slici)
- ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, pogotovo ako ste stariji.
- ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili vildagliptin ili racekadotril jer oni mogu povećati rizik od nastanka angioedema, ozbiljne alergijske reakcije.
- ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što je skleroderma ili sistemski lupus erythematosus
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti, morate obavijestiti svoga liječnika. Primjena ovog lijeka se ne preporučuje u prva tri mjeseca trudnoće, a može ozbiljno naštetiti vašem djetetu nakon trećeg mjeseca trudnoće (vidjeti poglavlje '**Trudnoća i dojenje**').
- ako primijetite slabljenje vida ili osjetite bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja tlaka u oku, a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedana nakon uzimanja ovog lijeka. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamide, možete biti izloženi većem riziku od razvoja ove bolesti
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
 - aliskiren.
- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik od

nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja ovog lijeka.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati RAMZID”.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina jer lijek nije primjenjivan u toj dobnoj skupini.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i RAMZID

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Ovo je važno zato što ovaj lijek može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova dok neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje ovog lijeka.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova jer oni mogu smanjiti učinak RAMZIDA:

- lijekovi za liječenje bolova i upala (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAIL, poput ibuprofena, indometacina ili acetilsalicilatne kiseline)
- lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, stanja šoka, zatajivanja srca, astme ili alergija poput efedrina, noradrenalina ili adrenalina. U ovome slučaju će liječnik morati izmjeriti Vaš krvni tlak.

Primjena sljedećih lijekova može povećati učestalost nuspojava ukoliko ih uzimate istodobno s RAMZID tabletama:

- lijekovi za liječenje bolova i upala (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAIL, poput ibuprofena, indometacina ili acetilsalicilatne kiseline)
- lijekovi koji mogu smanjiti količinu kalija u krvi, uključujući lijekove protiv zatvora, diuretike (lijekovi za izmokravanje), amfotericin B (koristi se za gljivične infekcije) i ACTH (koristi se za provjeru aktivnosti adrenalnih žlijezda)
- lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)
- lijekovi za liječenje srčanih problema, uključujući probleme s brojem otkucaja srca
- lijekovi koji sprječavaju odbacivanje organa nakon transplantacije poput ciklosporina
- diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje tekućine iz organizma), kao što je furosemid
- lijekovi koji mogu povisiti razinu kalija u krvi kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli, trimetoprim sam ili u kombinaciji sa sulfametoksazolom (za infekcije uzrokovane bakterijama) i heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)
- steroidi za liječenje upale, kao što je prednizolon
- nadomjesci kalcija
- alopurinol (koristi se za sniženje koncentracije urične kiseline)
- prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom)
- kolestiramin (za smanjivanje masnoća u krvi)
- karbamazepin (za epilepsiju)
- heparin (koristi se za razrjeđivanje krvi)

- temsirolimus (za liječenje raka)
 - sirolimus, everolimus (za sprečavanje odbacivanja presatka)
 - vildagliptin (koristi se za liječenje šećerne bolesti tipa 2)
 - racekadotril (za liječenje proljeva)
 - liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
- Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „**Nemojte uzimati RAMZID**” i “**Upozorenja i mjere opreza**”).

Obavijestite svog liječnika ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova. Ovaj lijek može utjecati na djelovanje ovih lijekova:

- lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji se uzimaju kroz usta i inzulin; RAMZID može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi dok uzimate RAMZID
- litij (lijek za liječenje mentalnih problema). Ovaj lijek može povisiti koncentraciju litija u krvi, stoga je potrebno da liječnik pažljivo prati koncentraciju litija.
- lijekovi za opuštanje mišića
- kinin (za malariju)
- lijekovi koji sadržavaju jod, a koriste se prilikom rendgenskog ili CT pregleda u bolnici
- penicilin (za infekcije)
- lijekovi za razrjeđivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (oralni antikoagulansi), kao što je varfarin.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s liječnikom prije uzimanja RAMZIDA.

Pretrage

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka:

- ako trebate obaviti ispitivanje funkcije paratiroidne žlijezde; ovaj lijek može utjecati na rezultate pretrage
- ako ste sportaš i trebate obaviti anti-doping kontrolu; ovaj lijek može dati pozitivan rezultat na testu.

RAMZID s hranom, pićem i alkoholom

Uzimanje alkohola s ovim lijekom može izazvati omaglicu ili ošamućenost.

Ako ne znate koliko smijete popiti dok uzimate ovaj lijek, razgovarajte s liječnikom, s obzirom da lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju).

RAMZID se može uzeti s obrokom ili između obroka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporuča se uzimati RAMZID tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a ne smije se uzimati od 13-tog tjedna, s obzirom da uzimanje RAMZIDA za vrijeme trudnoće može biti štetno za dijete.

Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja RAMZIDA, odmah obavijestite liječnika. Ako planirate trudnoću, potrebno je unaprijed prijeći na primjerenu alternativnu terapiju.

Dojenje

Ne biste smjeli uzimati RAMZID ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom uzimanja ovog lijeka možete osjetiti omaglicu. Ovo se najčešće događa na početku terapije s ovim lijekom ili kada počnete uzimati veću dozu. Ukoliko primijetite ovu nuspojavu, nemojte voziti niti rukovati alatima ili strojevima.

RAMZID sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

RAMZID sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati RAMZID

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje visokog krvnog tlaka

Liječnik će prilagoditi dozu koju uzimate tako da Vaš krvni tlak bude pod kontrolom.

Stariji bolesnici

Liječnik će smanjiti početnu dozu i postupno prilagođavati Vašu terapiju.

Uzimanje lijeka

- Lijek uzmite kroz usta, svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro.
- Tablete progutajte s tekućinom.
- Nemojte drobiti ili žvakati tablete.

Ako uzmete više RAMZID tableta nego što ste trebali

Obavijestite liječnika ili otidite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka Vas poveže netko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakiranje lijeka, da liječnik može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti RAMZID

- Ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimati RAMZID te odmah otidite liječniku, ako primijetite neke od sljedećih teških nuspojava jer ćete možda trebati hitnu medicinsku pomoć:

- oteklinu lica, usana ili ždrijela što može otežavati gutanje ili disanje, a mogu se javiti svrbež i osip. Ovo može ukazivati na tešku alergijsku reakciju na ovaj lijek.
- teške kožne reakcije uključujući osip, čireve u ustima, pogoršanje već postojeće kožne bolesti, crvenilo, pojavu mjehurića ili odvajanje kože (poput Stevens-Johnsonovog sindroma, toksične epidermalne nekrolize ili *erythema multiforme*).

Odmah se javite liječniku ukoliko primijetite:

- ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije probleme, kao što su srčani i moždani udar
- zadihanost, vrućica uz kašalj koja traje 2 do 3 dana te smanjeni apetit; to mogu biti znaci problema s plućima, uključujući upalu
- ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, krvarite dulje nego što je normalno, bilo kakvi znakovi krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži, mrlje na koži ili infekcije češće nego što je to uobičajeno, ako imate bolno grlo i groznicu, osjećate umor, nesvjesticu, omaglicu ili imate blijedu kožu - to mogu biti znaci problema s krvi ili koštanom srži
- jaki bolovi u želucu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa – upala gušterače)
- groznica, zimica, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) to mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre;
- jaka bol u oku, zamagljen vid ili viđenje aureola (svjetlost ovalnog oblika, svijetleći prsten) oko svjetala, glavobolja, obilno suženje ili mučnina i povraćanje koji mogu upućivati na stanje zvano glaukom; oslabljen vid, kratkovidnost što može biti stanje koje se naziva miopija.

Ostale nuspojave

Javite se liječniku ukoliko dođe do pogoršanja neke od sljedećih nuspojava ili ako traju dulje od nekoliko dana.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- glavobolja, osjećaj slabosti ili umora
- omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze ovog lijeka)
- suhi, nadražajni kašalj ili bronhitis
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu šećera u krvi, ako imate dijabetes, može se pogoršati
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu urične kiseline ili masti u krvi
- bolni, crveni ili natečeni zglobovi (pogoršanje stanja kod oboljelih od gihta).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- osip na koži, sa ili bez izbočenja dijelova kože
- crvenilo lica praćeno vrućinom, nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog sjedanja ili ustajanja
- problemi s ravnotežom (vrtoglavica)
- svrbež i neuobičajeni osjećaji na koži kao što su ukočenost, žarenje, peckanje, vrućina ili trnci (parestezija)
- gubitak ili poremećaj okusa
- poteškoće sa spavanjem
- depresija, anksioznost, pojačana nervoza ili nemir
- začepljen nos, upala sinusa (sinuitis), nedostatak zraka
- upala desni, nateknuta usta (gingivitis)
- crvene, natečene oči, koje svrbe ili suze (konjunktivitis)
- zvonjava u ušima (tinitus)
- zamućen vid
- gubitak kose
- bol u prsnom košu
- bol u mišićima (mijalgija)
- zatvor, bol u želucu ili crijevima
- probavne tegobe ili mučnina
- povećano izlučivanje tekućine (urin) tijekom dana, što može biti posljedica oštećenja bubrega
- znojenje jače od uobičajenog ili osjećaj žeđi
- gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija), smanjen osjećaj gladi

- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
- natečene ruke i noge (to mogu biti znaci da zadržavate više vode nego je uobičajeno)
- groznica
- seksualna impotencija u muškaraca
- krvne pretrage pokazuju smanjenje broja crvenih ili bijelih krvnih stanica te krvnih pločica ili koncentracije hemoglobina
- krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega
- krvne pretrage pokazuju sniženu razinu kalija u krvi.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- mučnina, proljev ili žgaravica
- crven i nateknut jezik (glositis) ili sluznica usta (aftozni stomatitis); suha usta
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu kalija u krvi.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- teškoće u koncentraciji, nemir ili zbunjenost
- rak kože i usana (nemelanomski rak kože)
- prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se ugrijete (Raynaudov fenomen)
- povećanje grudi u muškaraca (ginekomastija)
- krvni ugrušci uslijed teškog gubitka tekućine
- poremećaj sluha
- smanjeno suženje očiju
- objekti izgledaju žućkasto (ksantopsija)
- oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta)
- dehidracija
- oticanje, bol ili crvenilo u obrazima (upala žlijezde slinovnice)
- oticanje crijeva zvano 'angioedem tankog crijeva', uz simptome kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proljev
- povećana osjetljivost kože na sunce (fotoosjetljivost)
- teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama ili druge kožne reakcije kao što je osip praćen crvenilom na licu i čelu
- kožni osip
- mrlje na koži ili hladnoća u ekstremitetima
- problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)
- mišićnokoštana ukočenost ili nemogućnost pomicanja vilice (tetanija)
- slabost ili grčevi u mišićima
- smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena
- krv u mokraći, to može biti znak problema s bubrežima (intersticijski nefritis)
- povećana razina šećera u mokraći
- povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv prilikom krvnih pretraga
- krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica (pancitopenija)
- krvne pretrage pokazuju promjenu razina soli (elektrolita) kao što su natrij, kalcij, magnezij i klorid u krvi
- koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće.
- usporena ili narušena sposobnost reakcije
- poremećaj njuha (parosmija)
- teškoće pri disanju ili pogoršanje astme

- smanjeno suženje oka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

5. Kako čuvati RAMZID

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što RAMZID sadrži

Djelatne tvari su: ramipril i hidroklorotiazid.

Jedna RAMZID 2,5 mg / 12,5 mg tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Jedna RAMZID 5 mg / 25 mg tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidroklorotiazida.

Pomoćne tvari su: natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; umrežena karmelozanatrij; prethodno geliran škrob; natrijev stearilfumarat.

Kako RAMZID izgleda i sadržaj pakiranja

RAMZID 2,5 mg + 12,5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, ravne, dimenzija otprilike 4 mm x 8 mm, s urezom na jednoj strani i oznakom 12.5.

RAMZID 5 mg + 25 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, ravne, dimenzija otprilike 5 mm x 10 mm, s urezom na jednoj strani i oznakom 25.

Tableta obje jačine se može razdijeliti na jednake doze.

28 (4x7) i 56 (8x7) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 15. ožujka 2021.