

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cidiref 20 mg tvrde želučanootporne kapsule

Cidiref 40 mg tvrde želučanootporne kapsule

esomeprazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Cidiref i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cidiref
3. Kako uzimati Cidiref
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Cidiref
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Cidiref i za što se koristi

Cidiref sadrži esomeprazol. Esomeprazol pripada skupini lijekova koja se zove „inhibitori protonske pumpe“. Oni djeluju tako što smanjuju količinu kiseline koju luči Vaš želudac.

Cidiref se koristi u liječenju sljedećih stanja:

Odrasli

- Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). To je stanje u kojem se kiseli sadržaj želuca vraća u jednjak (cijev koja povezuje grlo sa želucem) uzrokujući bol, upalu i žgaravicu.
- Čirevi na želucu ili gornjem dijelu crijeva, koji su inficirani bakterijom *Helicobacter pylori*. Ukoliko je kod Vas utvrđeno takvo stanje, liječnik će Vam uz Cidiref propisati antibiotike koji će liječiti infekciju te omogućiti cijeljenje čira.
- Čirevi na želucu uzrokovani lijekovima iz skupine NSAIL (nesteroidni protuupalni lijekovi). Cidiref se također može koristiti kako bi spriječio nastanak želučanih čireva ukoliko uzimate lijekove iz skupine NSAIL.
- Višak kiseline u želucu uzrokovan izraslinom u gušterači (Zollinger Ellisonov sindrom).
- Produljeno liječenje nakon prevencije ponovnog krvarenja čira esomeprazolom za intravensku primjenu.

Mladi od 12 i više godina

- Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). To je stanje u kojem se kiseli sadržaj želuca vraća u jednjak (cijev koja povezuje grlo sa želucem) uzrokujući bol, upalu i žgaravicu.
- Čirevi na želucu ili gornjem dijelu crijeva, koji su inficirani bakterijom *Helicobacter pylori*. Ukoliko je kod Vas utvrđeno takvo stanje, liječnik će Vam uz Cidiref propisati antibiotike koji će liječiti infekciju te omogućiti cijeljenje čira.

H A L M E D

08 - 04 - 2026

ODOBRENO

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cidiref

Nemojte uzimati Cidiref

- ako ste alergični naesomeprazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako ste alergični na ostale lijekove iz skupine „inhibitori protonske pumpe“ (npr. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).
- ako uzimate lijek koji sadrži nelfinavir (koristi se u terapiji infekcije HIV-om).
- ako ste ikad razvili teški kožni osip ili ljuštenje kože, mjehure i/ili rane u ustima nakon primjene lijeka Cidiref ili drugih sličnih lijekova.

Nemojte uzimati Cidiref ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja lijeka Cidiref.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cidiref:

- ako imate ozbiljne teškoće s jetrom.
- ako imate ozbiljne teškoće s bubrežima.
- ako imate nedostatak vitamina B12 (cijanokobalamina).
- ako ste ikad imali kožnu reakciju nakon terapije s lijekom sličnim lijeku Cidiref koji smanjuje želučanu kiselinu.
- ako morate napraviti određenu krvnu pretragu (kromogranin A).

Cidiref može prikriti simptome drugih bolesti. **Stoga se odmah javite svome liječniku ukoliko Vam se prije ili za vrijeme uzimanja lijeka Cidiref dogodilo bilo što od navedenog:**

- ako značajno gubite na težini bez jasnog razloga ili imate teškoća s gutanjem.
- bol u želucu ili probavne smetnje.
- ako počnete povraćati hranu ili krv.
- ako imate crnu stolicu (stolica s primjesom krvi).

Ukoliko Vam je Cidiref propisan za uzimanje „po potrebi“, morate se javiti svom liječniku ako se Vaši simptomi nastave ili promijene karakter.

Uzimanje inhibitora protonske pumpe poput lijeka Cidiref, naročito dulje od godine dana, može Vam blago povećati rizik od prijeloma kuka, zapešća ili kralješnice. Obavijestite svog liječnika ako imate osteoporozu ili ako uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik za osteoporozu).

Uzimanje inhibitora protonske pumpe može blago povećati rizik od infekcija probavnog sustava, kao što su infekcije uzročnicima *Salmonella* i *Campylobacter*.

Osip i kožni simptomi

Ako dobijete osip na koži, posebice na područjima izloženima suncu obavijestite svog liječnika što je prije moguće, jer ćete možda morati prekinuti liječenje lijekom Cidiref. Sjetite se spomenuti i bilo koje druge štetne učinke poput boli u zglobovima.

Ozbiljne kožne reakcije, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu, reakciju na lijek praćenu eozinofilijom i sistemskim simptomima (engl. *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*, DRESS), prijavljene su u slučajevima liječenja lijekom Cidiref. Prestanite koristiti Cidiref i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od simptoma povezanih s ozbiljnim kožnim reakcijama opisanim u dijelu 4.

Drugi lijekovi i Cidiref

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

H A L M E D
08 - 04 - 2026
ODOBRENO

druge lijekove. To je potrebno s obzirom da Cidiref može promijeniti djelovanje nekih lijekova ili pak oni mogu promijeniti djelovanje lijeka Cidiref.

Ne uzimajte Cidiref tvrde kapsule ukoliko uzimate lijekove koji sadrže **nelfinavir** (koristi se u terapiji infekcije HIV-om).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako koristite bilo koji od sljedećih lijekova:

- Atazanavir (koristi se u terapiji infekcije HIV-om).
- Klopidoogrel (koristi se za sprječavanje krvnih ugrušaka).
- Ketokonazol, itrakonazol ili vorikonazol (koriste se za liječenje gljivičnih infekcija).
- Erlotinib (koristi se za liječenje raka).
- Citalopram, imipramin ili klomipramin (koriste se u liječenju depresije).
- Diazepam (koristi se za liječenje anksioznosti, opuštanje mišića te liječenje epilepsije).
- Fenitoin (koristi se za liječenje epilepsije). Ako uzimate fenitoin, liječnik bi Vas trebao nadzirati kad počnete i prestanete uzimati Cidiref.
- Lijekove koji se koriste za „razrjeđivanje krvi“, kao što je varfarin. Liječnik bi Vas trebao nadzirati kad počnete i prestanete uzimati Cidiref.
- Cilostazol (koristi se za liječenje intermitentne klaudikacije – boli u nogama dok hodate zbog nedovoljnog dotoka krvi).
- Cisaprid (koristi se kod probavnih smetnji i žgaravice).
- Digoksin (koristi se za srčane probleme).
- Metotreksat (lijeak za kemoterapiju, koji se koristi u visokim dozama za liječenje raka) – ako uzimate visoke doze metotreksata, liječnik će Vam možda privremeno prekinuti liječenje lijekom Cidiref.
- Takrolimus (koristi se kod presađivanja organa).
- Rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze).
- Gospina trava (*Hypericum perforatum*) (koristi se za liječenje depresije).

Ako Vam je liječnik propisao antibiotike amoksisilin i klaritromicin zajedno s lijekom Cidiref za terapiju čireva uzrokovanih infekcijom s *Helicobacter pylori*, vrlo je važno da kažete svom liječniku ukoliko uzimate bilo kakve druge lijekove.

Cidiref s hranom i pićem

Kapsule možete uzimati s hranom ili na prazan želudac.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Liječnik će odlučiti smijete li ili ne u tom razdoblju uzimati Cidiref. Nije utvrđeno prelazi li Cidiref u majčino mlijeko, stoga ne smijete uzimati Cidiref ukoliko dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da Cidiref utječe na sposobnost vožnje ili korištenja bilo kakvih alata ili strojeva. Međutim, nuspojave kao što su vrtoglavica i zamućenje vida mogu se javiti manje često ili rijetko (vidjeti dio 4.). Ukoliko se pojave, ne smijete voziti niti upravljati strojevima.

Cidiref sadrži saharozu

Cidiref se sastoji od šećernih kuglica koje sadrže saharozu, koja je vrsta šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Sadržaj natrija

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po kapsuli, tj. zanemarive količine natrija.

H A L M E D
08 - 04 - 2026
ODOBRENO

3. Kako uzimati Cidiref

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

- Ukoliko uzimate ovaj lijek kroz duže vrijeme, liječnik bi Vas trebao nadzirati (osobito ako ga uzimate duže od godinu dana).
- Ukoliko Vam je liječnik rekao da uzimate lijek po potrebi, obavijestite ga ako se simptomi promijene.

Koliko kapsula uzimati

- Liječnik će Vam reći koliko kapsula trebate uzimati, te koliko dugo. To ovisi o Vašem stanju, koliko imate godina te o funkciji Vaše jetre.
- Preporučene doze su niže navedene.

Uporaba u odraslih od 18 i više godina

Za liječenje žgaravice uzrokovane gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB-om):

- Ako je liječnik utvrdio da Vam je oštećenje jednjaka blago, preporučena doza je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 40 mg jednom dnevno tijekom 4 tjedna. Liječnik Vam može propisati da uzimate istu dozu tijekom dodatna 4 tjedna ukoliko jednjak još nije zacijelio.
- Preporučena doza nakon što se jednjak oporavio je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 20 mg jednom dnevno.
- Ako Vam jednjak nije oštećen, preporučena doza je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 20 mg svaki dan. Kada stanje bude pod kontrolom, liječnik Vam može reći da uzimate lijek po potrebi, i to najviše jednu tvrdu želučanootpornu kapsulu lijeka Cidiref od 20 mg svaki dan.
- Ako imate ozbiljnih teškoća s jetrom, liječnik Vam može smanjiti dozu.

Za liječenje čireva uzrokovanih infekcijom s *Helicobacter pylori* te sprječavanja njihovog ponovnog javljanja:

- Preporučena je doza jedna Cidiref tvrda želučanootporna kapsula od 20 mg dva puta na dan tijekom jednog tjedna.
- Liječnik će Vam također propisati i antibiotike, na primjer amoksisilin i klaritromicin.

Za liječenje želučanih čireva uzrokovanih NSAIL (nesteroidnim protuupalnim lijekovima):

- Preporučena je doza jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 20 mg jednom dnevno tijekom 4 do 8 tjedana.

Za sprječavanje želučanih čireva tijekom uzimanja NSAIL (nesteroidnih protuupalnih lijekova):

- Preporučena doza je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 20 mg jednom dnevno.

Za liječenje viška kiseline u želucu uzrokovanog izraslinom u gušterači (Zollinger Ellisonov sindrom):

- Preporučena doza je 40 mg lijeka Cidiref dva puta dnevno.
- Liječnik će prilagoditi dozu Vašim potrebama i odlučiti koliko dugo morate uzimati lijek. Najviša doza je 80 mg dva puta dnevno.

Produljeno liječenje nakon prevencije ponovnog krvarenja čira esomeprazolom za intravensku primjenu:

- Preporučena doza je jedna kapsula lijeka Cidiref 40 mg jednom dnevno tijekom 4 tjedna.

H A L M E D

08 - 04 - 2026

O D O B R E N O

Primjena u adolescenta od 12 i više godina

Za liječenje žgaravice uzrokovane gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB-om)

- Ako je liječnik utvrdio da Vam je oštećenje jednjaka blago, preporučena doza je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 40 mg jednom dnevno tijekom 4 tjedna. Liječnik Vam može propisati da uzimate istu dozu tijekom dodatna 4 tjedna ukoliko jednjak još nije zacijelio.
- Preporučena doza nakon što se jednjak oporavio je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 20 mg jednom dnevno.
- Ako Vam jednjak nije oštećen, preporučena doza je jedna tvrda želučanootporna kapsula lijeka Cidiref od 20 mg svaki dan
- Ako imate ozbiljnih teškoća s jetrom, liječnik Vam može smanjiti dozu.

Za liječenje čireva uzrokovanih infekcijom s *Helicobacter pylori* te sprječavanja njihovog ponovnog javljanja:

- Preporučena je doza jedna Cidiref tvrda želučanootporna kapsula od 20 mg dva puta na dan tijekom jednog tjedna.
- Liječnik će Vam također propisati i antibiotike, na primjer amoksicilin i klaritromicin.

Uzimanje lijeka

- Kapsule možete uzeti u bilo koje doba dana.
- Kapsule možete uzimati uz hranu ili na prazan želudac.
- Progutajte cijelu kapsulu s nešto vode. Nemojte žvakati niti drobiti kapsule. One sadrže obložene pelete (zrnca) koja sprječavaju razgradnju lijeka u želucu pod utjecajem kiseline. Stoga je važno da se pelete (zrnca) ne oštete.

Što učiniti ukoliko imate poteškoća s gutanjem kapsula

- Ako imate problema s gutanjem kapsula:
 - Kapsulu otvorite pa sadržaj stavite u čašu negazirane vode (bez mjehurića). Ne upotrebljavajte nikakvu drugu tekućinu.
 - Popijte smjesu odmah ili najkasnije 30 minuta od pripravljanja. Uvijek promiješajte smjesu neposredno prije no što je popijete.
 - Kako biste bili sigurni da ste popili sav lijek, isperite stjenke čaše s pola čaše vode i popijte je. Kruti komadići sadrže lijek – ne žvačite ih i ne drobite.
- Ako uopće ne možete gutati, sadržaj kapsule se može izmiješati s malo vode, uvući u štrcaljku i primijeniti kroz cjevčicu izravno u želudac („želučana sonda“). Na kraju ove upute se nalaze informacije o primjeni putem želučane sonde namijenjene zdravstvenim djelatnicima.

Primjena u djeca mlađe od 12 godina

- Cidiref tvrde želučanootporne kapsule se ne preporučuju djeci mlađoj od 12 godina.

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doze kod starijih osoba.

Ako uzmete više lijeka Cidiref nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Cidiref nego što Vam je liječnik propisao, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Cidiref

- Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, uzmite je odmah čim se sjetite. Ali, ako je vrijeme uzimanja sljedeće doze blizu, preskočite dozu koju ste zaboravili uzeti.
- Ne uzimajte dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od navedenih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Cidiref i obratite se odmah svom liječniku:

- Žutilo kože, tamna mokraća i umor što mogu biti simptomi teškoća s jetrom. Ovi su učinci rijetki, i mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba.
- Iznenadno piskanje, otekline usana, jezika i grla ili tijela, osip, nesvjestica ili teškoće pri gutanju (teška alergijska reakcija). Ovi su učinci rijetki, i mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba.
- Iznenadni nastup teškog osipa ili crvenila kože s mjehurima ili ljuštenjem može se javiti čak i nakon nekoliko tjedana liječenja. Mogu biti prisutni i veći mjehuri te krvarenje na usnama, očima, ustima, nosu i genitalijama. Ti kožni osipi mogu se proširiti do ozbiljnog oštećenja kože (ljuštenje epiderme i površinskih sluznica), s po život opasnim posljedicama. To može biti „*erythema multiforme*“, „Stevens-Johnsonov sindrom“ ili „toksična epidermalna nekroliza“. Ovi su učinci vrlo rijetki, i mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba.
- Rašireni kožni osip, visoka tjelesna temperatura i povećani limfni čvorovi (DRESS sindrom ili sindrom preosjetljivosti na lijek). Ovi su učinci vrlo rijetki, i mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba.

Ostale nuspojave uključuju:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- Glavobolja.
- Učinci na Vaš želudac i crijeva: proljev, bol u želucu, zatvor, vjetrovi (flatulencija).
- Mučnina i povraćanje.
- Dobroćudni polipi u želucu.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

- Oticanje stopala i gležnjeva.
- Poremećaj spavanja (nesanica).
- Omaglica, trnci poput „bockanja iglicama“, pospanost.
- Vrtoglavica.
- Suha usta.
- Promjene u krvnim testovima koji pokazuju rad jetre.
- Kožni osip, koprivnjača i svrbež.
- Prijelom kuka, zapešća ili kralježnice (ako se Cidiref uzima u visokim dozama i dulje vrijeme).

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

- Problemi s krvnom slikom kao što je smanjeni broj bijelih krvnih stanica ili krvnih pločica. To može uzrokovati slabost, modrice te povećati vjerojatnost obolijevanja od infekcija.
- Niske razine natrija u krvi. To može uzrokovati slabost, povraćanje i grčeve.
- Uznemirenost, zbunjenost i depresija.
- Promjene u osjetu okusa.
- Problemi s vidom kao što je zamućen vid.
- Iznenadno piskanje ili kratkoća daha (bronhospazam).
- Upala u ustima.
- Infekcija zvana kandidijaza koja se može razviti u crijevu, a uzrokovana je gljivicom.

- Teškoće s jetrom, uključujući žuticu koja može uzrokovati žuto obojenje kože, tamni urin i umor.
- Gubitak kose (ćelavost).
- Kožni osip nakon izlaganja suncu.
- Bol u zglobovima (artralgija) ili bol u mišićima (mialgija).
- Općenit osjećaj slabosti ili manjka energije.
- Pojačano znojenje.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

- Promjene u krvnoj slici uključujući agranulocitozu (nedostatak bijelih krvnih stanica).
- Agresivnost.
- Osoba vidi, osjeća i čuje stvari kojih nema (halucinacije).
- Teški problemi s jetrom koji dovode do zatajenja jetre i upale mozga.
- Iznenadni nastup teškog osipa ili mjehura na koži te ljuštenje kože. To može biti povezano s visokom temperaturom i bolovima u zglobovima (eritema multiforme, Stevens - Johnsonov sindrom, toksička epidermalna nekroliza, lijekom uzrokovan osip s eozinofilijom i sistemskim simptomima).
- Mišićna slabost.
- Teški problemi s bubrezima.
- Povećanje dojki u muškaraca.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- Ako uzimate lijek Cidiref dulje od tri mjeseca, moguće je da Vam se snize razine magnezija u krvi. Niske razine magnezija mogu se očitovati kao umor, nevoljno stezanje mišića, dezorijentiranost, konvulzije, omaglica ili ubrzano kucanje srca. Dobijete li neki od tih simptoma, odmah obavijestite svog liječnika. Niske razine magnezija mogu dovesti i do smanjenja razina kalija ili kalcija u krvi. Liječnik će možda odlučiti provoditi redovite pretrage krvi kako bi pratio razine magnezija.
- Upala crijeva (izaziva proljev).
- Osip, moguće praćen boli u zglobovima.

Cidiref može u vrlo rijetkim slučajevima utjecati na bijele krvne stanice što dovodi do nedostatka imunosti. Ako imate infekciju sa simptomima kao što je vrućica s pratećim **teško** pogoršanim općim stanjem ili vrućicu sa simptomima lokalne infekcije kao što je bol u vratu, grlu ili ustima ili teškoće s mokrenjem, morate se što prije javiti svom liječniku kako bi se pregledom krvi mogao isključiti manjak bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Važno je da tom prigodom kažete koje ste lijekove uzimali.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Cidiref

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza kratice EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cidiref sadrži

Djelatna tvar je esomeprazol (u obliku esomeprazolmagnezij trihidrata).

Jedna Cidiref 20 mg tvrda želučanootporna kapsula sadrži 22,3 mg esomeprazolmagnezij trihidrata što odgovara 20 mg esomeprazola.

Jedna Cidiref 40 mg tvrda želučanootporna kapsula sadrži 44,5 mg esomeprazolmagnezij trihidrata što odgovara 40 mg esomeprazola.

Pomoćne tvari:

Sadržaj kapsule: šećerne pelete (saharoza i kukuruzni škrob), hipromeloza (E464), talk (E533b), polisorbat 80 (E433), hidroksipropilceluloza (E463) (ne sadrži silicij), metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1, 30 postotna raspršina (sadrži natrijev dodecilsulfat i polisorbat 80), trietilcitrat (E1505).

Ovojnica kapsule za jačinu 20 mg: želatina, titanijev dioksid (E 171), željezov oksid (E 172).

Ovojnica kapsule za jačinu 40 mg: želatina, titanijev dioksid (E 171).

Kako Cidiref izgleda i sadržaj pakiranja

Cidiref 20 mg tvrde želučanootporne kapsule su tvrde kapsule veličine 3 s tijelom i kapicom ružičaste boje ispunjene gotovo bijelo do tamno kremasto obojenim želučanootpornim peletima.

Cidiref 40 mg tvrde želučanootporne kapsule su tvrde kapsule veličine 2 s tijelom i kapicom bijele boje ispunjene gotovo bijelo do tamno kremasto obojenim želučanootpornim peletima.

Cidiref je dostupan u blisterima s 28 ili 56 tvrdih želučanootpornih kapsula u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2026.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Primjena putem želučane sonde:

Preporučuje se uporaba sondi izrađenih od poliuretana (PUR) ili silikona.

Sonde izrađene od PVC-a nisu preporučljive za primjenu doze, budući da je utvrđeno prijanjanje peleta na PVC materijal, što rezultira slabom isporukom doze na izlazu sonde.

1. Kapsulu otvorite i istresite pelete (zrnca) u odgovarajuću štrcaljku koju napunite s približno 50 ml vode.
2. Štrcaljku odmah protresite tijekom 2 minute kako bi se sadržaj kapsule raspršio.

H A L M E D
08 - 04 - 2026
ODOBRENO

3. Štrcaljku držite okrenutu vrhom prema gore i provjerite da se vršak nije začepio.
4. Pripojite štrcaljku u gore opisanom položaju sonde.
5. Protresite štrcaljku i okrenite je vrškom prema dolje. Odmah injicirajte u sondu 5-10 ml. Nakon injiciranja okrenite štrcaljku i protresite je (štrcaljka se mora držati s vrškom okrenutim prema gore kako se ne bi začepila).
6. Okrenite vršak štrcaljke prema dolje i odmah zatim injicirajte u sondu dodatnih 5-10 ml. Ponavljajte postupak sve dok se štrcaljka ne isprazni.
7. Napunite štrcaljku s 10 ml vode i ponovite postupak opisan pod br. 5 ako je potrebno isprati ostatke pripravka u štrcaljki. Za neke sonde potrebno je 50 ml vode.